



INFORME DE SEGURIDAD

ALERTA INVIMA: Riesgo de TOC por uso de Metilfenidato y Lisdexanfetamina

La agencia sanitaria **ANVISA (Brasil)** alerta que el **metilfenidato** y la **lisdexanfetamina** pueden causar **trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)**, especialmente en niños y adolescentes.

-  **Síntomas:** Obsesiones o conductas repetitivas, tricotilomanía y dermatilomanía.
-  **Recomendación:** Realizar seguimiento a los pacientes, evaluar el tratamiento si aparecen síntomas y reportar cualquier reacción adversa a farmacovigilancia.

Notifique cualquier sospecha de reacción adversa a medicamentos al Programa Nacional de Farmacovigilancia, a través de los canales establecidos por el INVIMA.





FARMACOMCIENCIA

Hablemos de Medicamentos



INFORME DE SEGURIDAD

ALERTA: Fallo mortal de Caspofungina con filtros renales de poliacrilonitrilo (PAN)

La **EMA** advierte que la **caspofungina** puede perder eficacia en pacientes con **terapia de reemplazo renal continua (TRRC)** cuando se utilizan filtros de **poliacrilonitrilo (PAN)**.

-  **Para el personal de salud:** Verificar el tipo de filtro y, si es PAN, cambiar el antifúngico o el filtro. No aumentar la dosis.
-  **Para pacientes:** La caspofungina es de uso exclusivo hospitalario y no debe adquirirse por internet ni en farmacias comerciales.

Notifique cualquier sospecha de reacción adversa a medicamentos al Programa Nacional de Farmacovigilancia, a través de los canales establecidos por el INVIMA.





INFORME DE SEGURIDAD

ALERTA: Riesgo de tumor cerebral (meningioma) por ciertas progestinas

El **INVIMA** y agencias internacionales advierten que el uso de **ciproterona, nomegestrol, medroxiprogesterona, didrogesterona y clormadinona** puede aumentar el riesgo de **meningioma**, especialmente con dosis altas o tratamientos prolongados.

-  **Para el personal de salud:** Evitar su uso en pacientes con antecedentes de meningioma y suspender el tratamiento si se diagnostica este tumor.
-  **Para pacientes:** Consultar de inmediato si presenta cambios en la visión, dolor de cabeza persistente, pérdida de memoria, convulsiones, zumbido de oídos o debilidad en las extremidades.

Notifique cualquier sospecha de reacción adversa a medicamentos al Programa Nacional de Farmacovigilancia, a través de los canales establecidos por el INVIMA.





INFORME DE SEGURIDAD

ALERTA SANITARIA: Toxina Botulínica y Riesgo de Botulismo

Agencias de salud (**OMS, AEMPS e ISP**) alertan sobre el riesgo, aunque muy raro, de **botulismo iatrogénico** por la diseminación de la toxina botulínica.

-  **Para el personal de salud:** Aplicar únicamente productos con registro sanitario en centros autorizados, tratar oportunamente los casos sospechosos y reportarlos a VigiFlow.
-  **Para pacientes:** Buscar atención médica inmediata si presenta debilidad muscular o dificultad para moverse.

Notifique cualquier sospecha de reacción adversa a medicamentos al Programa Nacional de Farmacovigilancia, a través de los canales establecidos por el INVIMA.

